

# 新型コロナウイルスワクチン 3回目接種のお知らせ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

令和4年2月1日現在の情報です。今後変更される場合があります。

## ◎接種の対象

【原則】2回目接種から原則8か月以上経過した18歳以上の方

【呉市の対応方針】

1月25日から2回目接種完了から6か月を経過し、接種券をお持ちのすべての方に3回目接種を実施します。

## ◎使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。

## ◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛 (78.3→83.0%)、 疲労 (59.4→63.7%)	疼痛 (88.3→83.8%)、 <b>疲労</b> (65.4→58.7%) 頭痛 (58.8→55.1%)
10 - 50%	<b>頭痛</b> (54.0→48.4%)、筋肉痛 (39.3→39.1%) <b>悪寒</b> (37.8→29.1%)、関節痛 (23.8→25.3%)	<b>筋肉痛</b> (58.1→49.1%)、関節痛 (42.9→41.3%) <b>悪寒</b> (44.3→35.3%)、 <b>リンパ節症</b> (14.2→20.4%)
1 - 10%	<b>38度以上の発熱</b> (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%)、発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症(※) (0.4→5.2%)	<b>38度以上の発熱</b> (15.5→6.6%) <b>腫脹・硬結</b> (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%)

(注) 対象/人数:ファイザー2回目16~55歳/2,682人、ファイザー3回目18~55歳/289人、モデルナ2回目18歳以上/14,691人、モデルナ3回目18歳以上/167人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合:      5ポイント以上少ないもの、     5ポイント以上多いもの。

(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典:特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

## ◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果




英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

ワクチンの組み合わせ	抗体価
 ファイザー → ファイザー → モデルナ	 抗体価は <b>上昇</b>
 ファイザー → ファイザー → ファイザー	

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。

出典:Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

## ◎特に追加接種をおすすめする方

- ・高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
- ・重症化リスクが高い方の関係者・介助者（介護従事者など）などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
- ・医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」

## ◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をしないでください。

## ◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

## ◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

感染予防対策を継続していただくようお願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避



マスクの着用



石けんによる手洗い



手指消毒用アルコールによる消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村などにご相談ください。

ご不明な点はコールセンターへお問合せください。

問合せ内容	連絡先	電話番号	受付日・時間
ワクチン接種の一般的相談・専門的相談	広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター	082-513-2847	毎日 24時間対応
呉市集団接種会場の予約・問合せ 接種券の紛失・汚損等	呉市新型コロナウイルスワクチン接種事業コールセンター	0570-550-463	毎日 8:30-17:15