### 4種混合


- ◇接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。
- ◇対象者, 年齢, 間隔は定期予防接種として予防接種関連法令に定められたものです。

#### 生後2ヶ月~90ヶ月に至るまで 11歳以上13歳未満 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ 20日以上 シート シート コ期初回 6ヵ月以上 コ期初回 2種混合(DT)ワクチン コ期初回 1期初回 1期初回 1期初回

接種を開始する際は、4種混合ワクチンを使用してください。なお、4種混合の接種については、任意接種であっても15歳に達するまでの間に接種します。

## 5種混合

- ◇接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。
- ◇対象者, 年齢, 間隔は定期予防接種として予防接種関連法令に定められたものです。




接種を開始する際は、5種混合ワクチンを使用してください。 なお、5種混合の接種については、任意接種であっても15歳に達するまでの間に接種します。

# 不活化ポリオワクチン(単独)

- ◇接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。
- ◇対象者, 年齢, 間隔は定期予防接種として予防接種関連法令に定められたものです。



### 生ポリオワクチンの完了回数との不活化ポリオワクチンの接種回数



不活化ポリオワクチンを使用できるのは、ジフテリア・百日せき・破傷風(3種混合)ワクチンの回数がポリオの回数より多い場合です。 →不活化ポリオワクチンで3種混合の接種回数とあわせ、残りを4種混合で終了します。

3種混合部分の回数と、ポリオワクチンの回数がどちらも4回ずつの接種が必要です。(生ポリオワクチンのみ2回の場合は終了です。)